



# Basic



### COMPOSIZIONE

Rame solfato tribasico  
g 15,2 (190 g/l)

### CLASSIFICAZIONE

Pericoloso per l'ambiente (N)

### FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

### REGISTRAZIONE Min. San.

n. 14018 del 17/10/2007

### CONFEZIONI

bottiglia 1 L.  
tanica 10 L.



## Caratteristiche e modalità d'impiego

**BASIC** è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
AGRUMI	20 giorni	Allupatura Antracnosi Fumaggine Mal secco Melanosi Scabbia argentea Scabbia comune	300-350 ml/hl	Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
ASPARAGO	20 giorni	Alternariosi Antracnosi Batteriosi Peronospore Ruggine Septoriosi	300-400 ml/hl	Limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni.
ORTAGGI A FOGLIA	20 giorni	Alternariosi Antracnosi Batteriosi Peronospore Ruggini Septoriosi	300-400 ml/hl	Escluse patate novelle
ORTAGGI A STELO	20 giorni			
CAVOLI	20 giorni			
CETRIOLO	20 giorni			
LEGUMI	20 giorni			
MELANZANA	20 giorni			
POMODORO	20 giorni			
ZUCCHINO	3 giorni			
PATATA	20 giorni			
CICLAMINO		Antracnosi Maculature fogliari	250 ml/hl	
CIPRESSO		Cancro del Cipresso	500 ml/hl	Intervenire in pieno inverno.

# Basic

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
CONCIA FRUMENTO E RISO		Carie dei Cereali	100 ml/100 kg seme	
FILODENDRO		Batteriosi	250 ml/hl	Effettuare applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
FRAGOLA	20 giorni	Vaiolatura	2-3 l/Ha	Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
MANDORLO	20 giorni	Batteriosi Bolla Corineo Monilia	400-500 ml/hl	Intervenire prima della fase dei bottoni rosa. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura.
MELO E PERO	20 giorni	Cancro Ticchiolatura	800 ml/hl 300-800 ml/hl	Impiegare alla dose indicata nei trattamenti autunnali. Impiegare alla dose di 300-400 ml/hl nei trattamenti primaverili e alla dose di 800 ml/hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nectria.
NESPOLO	20 giorni	Ticchiolatura	300 ml/hl	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
NOCCIOLO	20 giorni	Batteriosi	400 ml/hl	Effettuare 2 trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE	20 giorni	Antracnosi	400 ml/hl	Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere 150 g/hl di olio minerale bianco.
OLIVO	20 giorni	Batteriosi Fumaggine Lebbra Occhio di pavone	500 ml/hl	
DRUPACEE	20 giorni	Bolla del Pesco Cancro delle Drupacee Corineo o vaiolatura Monilia	700-800 ml/hl	Effettuare trattamenti nel periodo invernale.
ROSA	20 giorni	Peronospora Ruggine Ticchiolatura	250 ml/hl	
VITE	20 giorni	Peronospora Marciume nero degli acini	300-400 ml/hl	Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.