

TIOVIT JET®

Fungicida in microgranuli idrodispersibili a base di zolfo micronizzato per impiego contro gli oidii in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura, cereali e barbabietola da zucchero

Composizione

100 g di prodotto contengono:
zolfo puro (esente da selenio) g 80
coformulanti q.b. a g 100



FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Agro S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 2923 dell'11.11.1978
Partita n. vedi corpo della confezione

Altri stabilimenti di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altri stabilimenti di confezionamento:
CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca (Hungary)
Isagro S.p.A., Aprilia (LT)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Altre taglie: g 250-400-450-500; kg 10-20-25

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Kg 1

syngenta

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveneni.

TIOVIT JET è una formulazione tecnologicamente avanzata ottenuta per micronizzazione frazionata. Grazie alle particelle (microboliche) di dimensioni ottimali caratterizzate da elevata omogeneità, TIOVIT JET consente allo zolfo di estrinsecare tutte le sue caratteristiche. La particolare formulazione, caratterizzata da assenza di polvere, rapida dispersibilità in acqua e superiore miscibilità facilita la preparazione della poltiglia.

Modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose in 100 l di acqua	Note
Vite	Oidio	200-400 g	Medio-bassa pressione della malattia
		600-800 g	Alta pressione della malattia
Pomacee	Oidio	600 g	Trattamenti in pre-fioritura
		200-300 g	Trattamenti in post-fioritura
Drupacee	Oidio	200-600 g	Utilizzare la dose più elevata in pre-fioritura e dopo la raccolta
Nocciolo	Oidio	200-500 g	
Fragola	Oidio	200-500 g	
Ortaggi	Oidio	150-500 g	
Barbabietola da zucchero	Oidio	8 kg/ha	2 interventi: alla comparsa della malattia e 20 giorni più tardi
Cereali	Oidio	8 kg/ha	Trattare alla comparsa della malattia sulla penultima foglia
Floreali ed ornamentali	Oidio	150-500 g	

Con temperature molto elevate alle dosi più alte, il prodotto può risultare fitotossico. Se ne consiglia pertanto l'impiego nelle ore più fresche della giornata.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14.10.2010

Preparazione della poltiglia

Versare TIOVIT JET direttamente nel serbatoio dell'atomizzatore riempito per 2/3 d'acqua mantenendo in funzione l'agitatore. Portare quindi a volume.

Compatibilità

TIOVIT JET non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali. Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali.

Nella preparazione di miscele estemporanee, preparare prima la poltiglia con TIOVIT JET, quindi aggiungere gli altri formulati poco prima di irrorare la miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Può arrecare danno alla cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
Su floreali /ornamentali, in considerazione della rapida evoluzione varietale, si consiglia di eseguire saggi su piccole superfici prima di estendere il trattamento a pieno campo.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta



**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
14.10.2010**