

Tabella di Mills e Laplante

Ore di bagnatura necessarie per avere:							
Temperatura media durante la bagnatura	Infezioni primarie (da Ascospore)				Infezioni secondarie (da conidi)	Tempo di incubazione in giorni	
	Leggera	Tempo a disposizione per il trattamento con fungicidi organici normali ORE (1)	Media	Forte			
fino 5	—	—	oltre gg 2	—	—	—	
5	37	81,4	48	73	23,5	22	
6	26	57,2	34	51	17,5	20	
7	21,5	47,3	27	40	14,5	19	
8	18	39,6	23	34	12	18	
9	15	33	20	30	10	17	
10	14	30,8	19	28	9	16	
11	12,5	27,5	17,5	26	8	15	
12	11,5	25,3	16	24	7,5	14	
13	10,5	24	15	22,5	7	13	
14	10	24	14	21	6,5	12	
15	9,5	24	13	20	6,5	11	
16	9	24	12,5	19	6	10	
17	9	24	12	18	6	9	
18	9	24	12	18	6	8	
19	9	24	12	18	6	8	
20	9	24	12	18	6	8	
21	9	24	12	18	6	8	
22	9	24	12	18	6	—	
23	9	24	12	18	6	—	
24	9,5	24	12,5	19	6,5	—	
25	10,5	24	14	21	6,5	—	

(1) - Questo periodo è dato dalle ore necessarie per un'infezione leggera (riportata sulla colonna 2) e moltiplicata per un coefficiente di 2,2.